

# ATRATOL<sup>®</sup>

## Gel Baraticida



**Longa Ação Residual com Maior Atratividade do Mercado**  
**Ação Rápida com Efeito Dominó**  
**Coloração Adequada**

*Quem faz o melhor, faz a diferença*

**ChemoNE**  
INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA

# Ficha Técnica

# ATRATOL<sup>®</sup>

## Gel Baraticida



### CLASSE

Inseticida

### GRUPO QUÍMICO

Neonicotinóide

### INGREDIENTE ATIVO

Imidacloprid

### NOME QUÍMICO

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

### FÓRMULA MOLECULAR

$C_9H_{10}ClN_5O_2$

### COMPOSIÇÃO

Imidacloprid 2,15% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001%, solventes, emulsificante, atrativos, veículo.

### MECANISMO DE AÇÃO

Age diretamente no sistema nervoso central dos insetos, provocando paralisia e morte.

### DADOS TOXICOLÓGICOS

DL<sub>50</sub> Oral Aguda: > 2000 mg/kg  
DL<sub>50</sub> Dermal Aguda: > 2000 mg/kg  
Irritabilidade Dérmica: Não Irritante  
Irritabilidade Ocular: Não Irritante  
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante

### INDICAÇÃO DE USO

ATRATOL<sup>®</sup> Gel Baraticida – inseticida indicado para o combate a baratas da espécie *Blattella germanica*.

### MODO DE USAR

ATRATOL<sup>®</sup> Gel Baraticida vem pronto para uso em seringas contendo 30g cada. Para aplicar basta pressionar o êmbolo ou a pistola dosadora; aplicar pequenos filetes de gel nos pontos mais acessíveis às baratas.  
DOSAGEM: 0,05g/m<sup>2</sup>.

**PONTOS DE APLICAÇÃO:** Aplique o produto nos locais onde as baratas costumam transitar, tais como, cozinhas, banheiros, porões, despensas, garagens, etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de parede, embaixo e atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro e embaixo de armários e outros móveis, etc.

Obs: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

### AÇÃO TÓXICA

Hipersensibilizante e anemia

### ANTÍDOTOS/TRATAMENTO

Anti-histaminico e tratamento sintomático

### PRECAUÇÕES

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. "CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!"** Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. As embalagens vazias devem ser inutilizadas e descartadas em lixeira comum. Observar legislação estadual e municipal específica. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, e em local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.

### APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 seringa plástica de 30g.  
Caixa de Despacho com 36 cartuchos.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mônica da Nóbrega Gomes  
CRQ/PE nº 01203605 – 1ª Região

**REGISTRADO NO MS SOB O Nº 3.2398.0042.001-7**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: TEL: (81) 3117. 1000**

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA: CEATOX : 0800 722.6001**

**ANTES DE USAR O ATRATOL<sup>®</sup> GEL BARATICIDA, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA**