

ADMINISTRACIÓN DE VANCOMICINA ORAL

1. Indicación

La administración de vancomicina oral está indicada para un tipo de infección conocida como colitis pseudomembranosa que se asocia a tratamientos prolongados con algunos antibióticos.

2. Posología

La dosis más habitual es de 500 mg repartidos en 4 tomas (125 mg / 6h) durante 7-10 días. En los casos puntuales, se puede aumentar hasta los 2 g al día.

3. Elaboración

En las siguientes instrucciones se detallan las recomendaciones generales para la preparación de vancomicina oral.

3.1 Material necesario


- Vial de vancomicina 500 mg polvo para prepararlo y diluirlo.
- Jeringuilla de 10 mL con aguja.
- Agua para inyectables (API).
- Vaso de agua normal.

3.2 Preparación del medicamento

1. Tome el vial de vancomicina 500 mg y retire la tapa protectora.
2. Cargue 10 mL de API en la jeringuilla.
3. Inyecte completamente el contenido de la jeringuilla en el vial de vancomicina lentamente. Agite suavemente el vial hasta que el polvo se diluya de forma completa.



4. Para administrar la dosis habitual de 125 mg de vancomicina utilice una jeringuilla para tomar **2,5 mL** de la solución preparada y viértalos en un vaso. En caso de tener recetada otra dosis puede realizar el siguiente cálculo:
 - Volumen a extraer (en mililitros) = dosis (en miligramos) / 50



5. Añada aproximadamente unos 30 mL de agua.

4. Conservación

Puede guardar el vial de vancomicina preparado en la nevera durante un período máximo de 24 horas. Si la dosis es de 125 mg / 6 horas, con el vial de 500 mg de vancomicina tiene para las 4 dosis del día.